

Envoyer pour test

Si un missionnaire appelle avec l'un des symptômes suivants, contactez le service d'urgence le plus proche ou le centre de test COVID-19 pour plus d'informations.

- Douleur ou pression thoracique constante
- Extrême difficulté à respirer
 - Vous ne pouvez pas monter un escalier sans vous arrêter pour vous reposer et reprendre votre souffle
 - Vous ne pouvez pas terminer deux phrases sans avoir à vous arrêter pour respirer
- Étourdissements sévères et constants
- Troubles de l'élocution
- Difficulté à se réveiller

Auto-isolement (en cas de maladie)

Si un missionnaire appelle avec l'un des symptômes suivants :

- Fièvre, frissons ou transpiration
- Difficulté à respirer
- Toux nouvelle ou aggravée
- Gorge irritée
- Douleurs dans tout le corps
- Vomissements ou diarrhée

1. Auto-isolement dans une chambre avec salle de bain séparée (si possible)

- a. S'il n'y a pas de salle de bain séparée, toutes les surfaces doivent être nettoyées avec un nettoyeur désinfectant après chaque utilisation.
- b. Si la personne doit sortir de la pièce, elle doit porter un masque.
- c. Si d'autres doivent entrer dans la même pièce, ils devraient envisager de porter un masque.
- d. Les repas doivent être préparés et livrés au missionnaire isolé. Lorsque cela est possible, l'utilisation d'ustensiles jetables et d'assiettes en papier peut être envisagée. Si cela n'est pas disponible, tous les éléments manipulés par le missionnaire isolé doivent être immédiatement placés dans de l'eau chaude savonneuse pour être nettoyés et les mains doivent être lavées et un désinfectant pour les mains utilisé avant de toucher autre chose.
- e. Boire beaucoup d'eau.
- f. Repos.
- g. Prendre du Tylenol (acétaminophène) ou du paracétamol pour la fièvre. Essayer d'éviter l'ibuprofène et le naproxène.

2. Rester en isolement pendant 10 jours après le début des symptômes et pendant 3 jours après la disparition complète des symptômes. La résolution des symptômes comprend plus de fièvre (sans utilisation de médicaments réduisant la fièvre), plus de diarrhée, et la résolution de la toux et de l'essoufflement. Cela peut totaliser plus ou moins de 14 jours en fonction de la gravité des symptômes.

- Sortir le missionnaire de l'isolement n'élimine pas la nécessité de maintenir des recommandations communautaires appropriées pour l'éloignement social et/ou la saisie du domicile. Cela signifie simplement qu'ils peuvent retourner dans un environnement moins isolé.

3. Si les symptômes du missionnaire isolé s'aggravent, comme décrit dans la section « Envoyer pour le test », contactez le service des urgences ou le centre de test COVID-19 pour plus d'informations.

Test positif au COVID-19

1. Si le missionnaire est testé positif au COVID-19, les mesures d'auto-isolement (a-g) ci-dessus doivent immédiatement être mises en place.
2. Le missionnaire dont le test de dépistage du COVID-19 est positif devrait préparer une liste des personnes avec lesquelles il a été en contact depuis trois jours avant le début des symptômes. Si le missionnaire n'a pas présenté de symptômes, la liste doit inclure ceux avec lesquels il a été en contact au moins trois jours avant le jour du test.
3. Le centre de test, qu'il s'agisse du service des urgences ou d'un autre endroit identifié, fournira probablement des instructions après les symptômes, mais s'il ne le fait pas :
 - a. Le missionnaire devrait revenir pour un test COVID-19 une fois les symptômes résolus. La résolution des symptômes comprend plus de fièvre (sans utilisation de médicaments réduisant la fièvre), plus de diarrhée, et la résolution de la toux et de l'essoufflement.
 - b. Un deuxième test COVID-19 24 heures après le premier test (a) doit être programmé.
 - c. Si les deux tests sont négatifs, les restrictions d'isolement peuvent être levées. Le missionnaire n'est plus contagieux.

Sortir le missionnaire de l'isolement n'élimine pas la nécessité de maintenir des recommandations communautaires appropriées pour l'éloignement social et/ou la saisie du domicile. Cela signifie simplement qu'ils peuvent retourner dans un environnement moins isolé et ne sont plus contagieux.

Emplacement sur www.missionarymedical.org

Mission President Resources -> COVID-19 -> Reference Guide (Ressources du président de mission -> COVID-19 -> Guide de référence)

Medical Care -> Missionary Department Pre-Field and In-Field Medical Guidelines -> Infectious Diseases -> COVID-19 Related Resources -> Reference Guide

Policies -> Missionary Department Pre-Field and In-Field Health Guidelines -> Infectious Diseases -> COVID-19 Related Resources -> Reference Guide